



Sosnovska latvānis

(*Heracleum sosnowskyi* Manden)



Lai mazinātu latvāņa izplatību, nedrīkst pieļaut augu ziedēšanu un sēklu veidošanos!

Invazīvs augs



Zieds atgādina milzīgu dilli, bet lapas līdzinās rabarbera lapām



Rada specifisku anīsa vai fenheļa smaržu



Vidējais augstums 3m



Latvijā ieviests kā lopbarības augs 20. gs 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā



Daudzgadīgs

Veido slēgtu auga sabiedrību, no kuras izpiež citas sugas



Agresīvs, Latvijas dabai neraksturīgs augs

Augšanas apstākļi



Aug neitrālās (vidējais skābums 6,3 – 7,0), mēreni mitrās un mitrās augsnēs



Salizturīgs (jaunie augi spēj izturēt -4°C līdz -7°C, pieauguši augi – no -25°C līdz pat -45°C zem sniega segas)



Gaismas prasīgs, - nepatīk noēnojums

Vairošanās



Vairojas ar sēklām (lielākā daļa uzdīgst nākamā gada pavasarī)



Sēklas ienākas augusta beigās vai septembra sākumā (viens augs var radīt pat līdz 100 000 sēklu!)



Pat vienreizēja sēklu izsēšanās veido bagātu sēklu banku augsnē, galvenokārt vairāku metru diametrā ap augu (jauno augu dīgsti var sasniegt 1500 – 2000 gb uz 1m²)



Latvāņa sēklas visvairāk izplata vējš un ūdens

Izplatība



Izplatīts gar ceļiem, neapstrādātās lauksaimniecības zemēs, grāvjos, upju un ezeru krastmalās, gar dzelzceļiem, krūmos, u.c.

**Eiropā visvairāk izplatīts Baltijas valstīs.
Strauji izplatās visā Latvijas teritorijā.**



Dabas aizsardzības
pārvalde



Šo programmu finansē
Eiropas Savienība



LATVIJA
LIETUVA
BALTKRIEVIJA
2014-2020

