

# Sīļķu dzimta Clupeidae

# Paledē

## Alosa fallax



līdz 0,6 kg



vienā reizē iznērš  
0,3-36,0 tūkst. ikru



dzīves ilgums nepārsniedz  
10 gadu vecumu



vēžveidīgie un zivju mazuļi



Latvijā palede sasniedz 39 cm  
(maksimālais garums 60 cm)

Paledē ir anadroma\* zivs, lai gan dažos ezeros sastopama arī saldūdens forma. Dzīvo jūrā, nārstot dadas uz upēm, parasti uz to grīvām un lejtecēm. Mēdz uzturēties baros. Mazuļi migrē uz jūru pirmajā gadā.

Dzimumgatavība iestājas 2-3 gadu vecumā, sasniedzot 27-30 cm garumu. Ziemeļeiropā upēs ienāk maijā-jūnija sākumā. Nārsto upju lejtecēs maijā-augustā (ūdens t° no 12 līdz 18°C). Raksturīgs vienlaicīgs nārsts. Paledē nārsto līdz pat 4 reizēm savā mūžā. Ikri tiek nērsti uz smiltīm un oļiem, un nesti pa straumi. To attīstība ilgst 2-8 dienas. Nārsta laikā pieaugašās zivis nebarojas, kamēr atrodas saldūdeņos.

### Sugas izplatība pasaulē un Latvijā



Atlantijas okeāna ziemeļaustrumi – no Skandināvijas austrumu krasta līdz Marokas krastiem, tai skaitā Vidusjūra, Britu salas un Baltijas jūra, kā arī Melnā jūra.

Latvijā samērā bieži sastopama Baltijas jūras piekrastē. To sastopamība Latvijā atkarīga no Kuršu līča populācijas svārstībām. Retāk ietekās jūrā un Rīgas jūras līcī.

### Apdraudošie faktori un aizsardzība



- piesārņojums
- aizsprostu būve uz upēm



- Latvijā un Eiropā apdraudēta suga, Latvijā ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama suga.
- Padomes Direktīva 92/43/EK (1992.gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (II un V pielikums)
- 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu (III pielikums)
- 14.11.2000. MK noteikumi Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (2.pielikums)
- Latvijas Sarkanā grāmata (III kategorija)

### Interesanti fakti

- Zināmas 5 pasugas.

\*anadromas zivis – ceļotājzivis, kuras izplatītas jūrā un veic regulāras nārsta migrācijas uz saldūdeņiem.